

FICHA TÉCNICA



“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS”

No. DE REGISTRO: 1007 – P- 527

Composición Química

Ingrediente activo:	P/V
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-Dimetil ciclopropano carboxilato	2.50 %
Ingredientes inertes:	
Solventes y emulsificante.	97.50 %
Total:.....	100.00 %

CONTIENE: 25 GRAMOS DE DELTAMETRINA POR LITRO DEL PRODUCTO FORMULADO

INSECTICIDA PIRETROIDE EN CONCENTRADO EMULSIONABLE

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

PRECAUCIÓN

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”.

“NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO: DEMIX® 2.5 CE es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión contra las siguientes plagas:

USO RECOMENDADO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS ml/Ton de grano
Maíz (Granos almacenados)	Gorgojo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>) Barrenador grande de los granos (<i>Prostephanus truncatus</i>) Barrenador pequeño de los granos (<i>Rhyzopertha dominica</i>) Carcoma aserrada de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Gorgojo castaño de la harina (<i>Tribolium castaneum</i>) Gorgojo confuso de la harina (<i>Tribolium confusum</i>) Palomilla de los granos (<i>Sitotroga cerealella</i>)	20 - 30
Sorgo (Granos almacenados)	Barrenador grande de los granos (<i>Prostephanus truncatus</i>) Picudo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>) Carcoma aserrada de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	20 - 30
Trigo-Avena-Cebada (Granos almacenados)	Barrenador grande de los granos (<i>Prostephanus truncatus</i>) Barrenador pequeño de los granos (<i>Rhyzopertha dominica</i>) Carcoma aserrada de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Gorgojo confuso de la harina (<i>Tribolium confusum</i>) Palomilla de los granos (<i>Sitotroga cerealella</i>) Palomilla india de la harina (<i>Plodia interpunctella</i>) Picudo de los granos (<i>Sitophilus granarius</i>)	20 - 30
Arroz (Granos almacenados)	Barrenador grande de los granos (<i>Prostephanus truncatus</i>) Barrenador pequeño de los granos (<i>Rhyzopertha dominica</i>) Carcoma aserrada de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Gorgojo confuso de la harina (<i>Tribolium confusum</i>) Palomilla de los granos (<i>Sitotroga cerealella</i>) Palomilla india de la harina (<i>Plodia interpunctella</i>) Picudo de los granos (<i>Sitophilus granarius</i>) Picudo del arroz (<i>Sitophilus oryzae</i>)	20 - 30
Maíz (Granos almacenados en costales o sacos)	Gorgojo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>) Barrenador grande de los granos (<i>Prostephanus truncatus</i>) Barrenador pequeño de los granos (<i>Rhyzopertha dominica</i>) Carcoma aserrada de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Gorgojo castaño de la harina (<i>Tribolium castaneum</i>) Gorgojo confuso de la harina (<i>Tribolium confusum</i>) Palomilla de los granos (<i>Sitotroga cerealella</i>)	20 - 30
TRATAMIENTO	DOSIS	APLICACIONES
Directamente sobre granos y semillas almacenados a granel: Avena (Avena sativa), Arroz (Oryzae sativa), Cebada maltera (Hordeum spp), Frijol (Phaseolus vulgaris), Maíz (Zea mays), Maíz quebrado (Grit), Sorgo (Sorghum vulgare), Trigo (Triticum spp.)	*20 ml + 280 ml de agua por Ton de grano (0.5 ppm) para almacenamiento de 6 meses. *40 ml + 260 ml de agua por Ton (1.0 ppm) para almacenamiento de 12 meses.	Aplicar con equipo de aspersión con dosificador especial para descarga. Al momento de descargar el silo o bodega ver tabla de ajustes de equipo.
Granos y semillas en costales o sacos estibados.	100 ml por 10 litros de agua.	Aplicar un litro de mezcla por 10 m ² dirigiendo la aspersión a las partes expuestas de los sacos y los espacios entre ellos.
Superficies de camiones, barcos, vagones, bodegas, trojes y silos, antes y durante el almacenamiento.	100 ml por 10 litros de agua.	Aplicar un litro de mezcla por cada 20 m ² de superficie de madera, metal, plástico, hormigón o piedra.
Tratamiento espacial no residual de almacenes, bodegas, silos, graneles ó barcos.	40 ml por litro de diluyente (Diesel, kerosén, agua).	Para tratar 1,000 m ³ utilizando equipo de termonebulización.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos. Los alimentos y los enseres de cocina deben protegerse.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico a peces y moderadamente tóxico para abejas.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea, incoordinación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: No inducir al vómito. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Si la contaminación fue en los ojos lave con suficiente agua limpia durante un lapso de 15 minutos.

POR VÍA DÉRMICA: Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 1-8010029832

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroides.

TRATAMIENTO: No hay antídoto. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y Diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICADO POR:

QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

DISTRIBUIDO E IMPORTADO POR:

Quimix de Costa Rica QCR S.A.

Danza del sol Curridabat Casa 2H, San José,
Costa Rica

FORMULADO EN MÉXICO

06.04.15 TR