

FICHA TÉCNICA



“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS”

No. DE REGISTRO EN GUATEMALA: PP-164

No. DE REGISTRO EN EL SALVADOR: PP-164

Composición Química

Ingrediente activo:	% en peso
Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il) -3-hidroxi-1-fenil-propil] -4-hidroxi-2H-1-benzopirán-2-ona. (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	0.005 %
Ingredientes inertes:	
Atrayente y vehículos	99.995 %
Total:	100.00 %

CONTIENE: 0.05 GRAMOS DE BROMADIOLONA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE/ MEZCLA CEREALES

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

PRECAUCIÓN

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”. “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (guantes de látex y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO: ERRADIC® CEBO ENVENENADO es una mezcla de cereales que actúa como un poderoso rodenticida anticoagulante de segunda generación, que de una sola dosis elimina ratas y ratones en el ámbito urbano.

Se recomienda colocar el cebo envenenado dentro de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Se recomienda colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

DOSIS Y MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

Plagas	Aplicación y Dosis
RATAS Rata de Alcantarilla <i>Rattus norvegicus</i>	Áreas Urbanas Usar 50 a 100 g por cebadero a intervalos de 5 a 10 metros para el control de ratas. Usar 25 g por cebadero a intervalos de 2.5 metros para el control de ratones. Revisar las áreas o las estaciones de cebado diariamente. Repetir la dosis hasta que no haya consumo.
Rata de los Tejados <i>Rattus rattus</i>	Áreas Urbanas (Pacios, jardines, bodegas, campos de golf, parques, etc.) Colocar el cebo directamente a la entrada de las madrigueras, cerca de los daños y en los caminos de los roedores a través de la vegetación.
RATONES Ratón Doméstico <i>Mus musculus</i>	Usar 1-3 Kg por cada hectárea y por aplicación, según el grado de infestación Repetir las aplicaciones de ERRADIC hasta que la actividad de los roedores cese.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex y botas de neopreno).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres pequeños de sangre caliente (Mamíferos y Aves).

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya o perfora los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Iniciales, epistaxis (sangrado por la nariz), sangrado por las encías, petequias (puntillito en la piel) y hematomas (moretones) alrededor de las articulaciones y los glúteos, dolor abdominal y de espalda, sangre en orina, cólico renal, debilidad, anemia e hipotensión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Si la contaminación fue en los ojos lave con suficiente agua limpia durante un lapso de 15 minutos.

POR VÍA DÉRMICA: Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

“NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE, VISITAR AL MÉDICO”.

**TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA: 1-8010029832**

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Hidroxicumarinas.

TRATAMIENTO: El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Administrar tratamiento con dosificación específica de Vitamina K1 (Fitonadiona) por vía intramuscular, oral o intravenosa. Lleve el paciente con el médico.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICADO:

QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

DISTRIBUIDORES:

QUIMIX de Centroamérica, S.A.

Av. Del Ferrocarril (Atanasio Tzul) 19-97, Zona 12
Empresarial El Cortijo,
Bodega No. 403,
Guatemala, Guatemala

SAGRIP en El Salvador

Urbanización Lomas de Altamira PJE Clarinero,
Calzada Guarda Barranco No. 14,
El Salvador, San Salvador.

FORMULADO EN MÉXICO

06.04.15 TR

QUIMIX DE CENTROAMÉRICA, S.A.

AV. DEL FERROCARRIL (ATANASIO TZUL) 19-97, ZONA 12 EMPRESARIAL EL CORTIJO, BODEGA No. 403,
GUATEMALA, C.A. TEL: (00 502) 2473 4074 (75) FAX: (00 502) 2474 4195

www.quimix.com.mx