



FICHA TÉCNICA

“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORES DE PLAGAS”



No. DE REGISTRO: **PP-178**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	P/P
Temefos: 0,0´ - tiodi-4-1-fenilen 0,0,0´0´ - tetrametil fosforotioato	1.00%
Ingredientes inertes:	
Portador, adherente y secante.	99.00%
Total	100.00%

CONTIENE: 10 GRAMOS DE TEMEFOS POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO.

INSECTICIDA Y/O LARVICIDA GRANULADO

PRECAUCIÓN

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA. EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”. “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO

La dosis de aplicación de **LARVAFOS® 1% SG** va a depender del tipo de agua a tratar. Larvafos controla las larvas de mosquitos *Aedes aegypti*, *A. albopictus*, *Anopheles spp.* y *Culex spp.*

RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Tipo de agua	Dosificación
LIMPIA (Lagunas artificiales, lagos, agua estancada y charcos).	
MODERADAMENTE CONTAMINADA (Agua con marea, pantanos, Ciénegas y aguas con contenido de materia orgánica).	20 g / 200 L (1 sobre)
ALTAMENTE CONTAMINADA (drenaje, tubos de desagüe, aguas muy contaminadas).	20 – 40 g / 200 L (1 ó 2 sobres)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN LOS ANIMALES Y ECOLOGÍA:

No deberá aplicarse a cultivos destinados a la alimentación, forrajes o pasturas. Producirá mortandad en camarones recién nacidos o muy jóvenes que se encuentren en aguas con marea que ha sido tratada a la dosis indicada.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien

cerrado. Destruya o perforo los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, temblor de lengua y párpados. Severos: Diarrea profusa, dificultad respiratoria, micción y defecación involuntarias, convulsiones y cianosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve



inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Si la contaminación fue en los ojos lave con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

POR VÍA DÉRMICA: Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INTOXICACIÓN TOXICOLÓGICA: 1-8010029832

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado.

TRATAMIENTO: Administre Atropina, 2 comprimidos de 0.5 mg. cada uno P.O., repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar en adultos 1-5 mg I.V. o I.M., en niños 0.01-0.05 mg/kg de peso corporal. Cada 5 a 15 min hasta alcanzar la atropinización.

Dosis de mantenimiento: 0.5 a 1 mg I.V. (adulto) cada hora, según respuesta del paciente, durante al menos 48 h. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicados.

CENTRO DE INFORMACIÓN

TOXICOLÓGICA.....PAÍS
Tel. 225 13560.....Guatemala
Tel. 2525 5800 Ext. 148 y 149.....El Salvador
Tel. 331 1006.....Honduras
Tel 289 4514.....Nicaragua

GARANTÍA: QUIMIX S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICADO POR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

AV. CENTRAL 206, 2DO PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01180, MÉXICO D.F. TEL. 01(55)52 784 680

Distribuido e Importado en Guatemala

Por: QUIMIX de Centroamérica, S.A.
Av. Del Ferrocarril (Atanasio Tzul)19-97, Zona 12 Empresarial El Cortijo, Bodega No. 403, Guatemala, Guatemala
Tel.(502) 24730101

HECHO EN MÉXICO

17.04.15 TR