

FICHA TÉCNICA**Gel Cebo Cucarachicida
"USO DOMÉSTICO"**

No. DE REGISTRO EN MÉXICO: **RSCO-DOM-INAC-174-309-092-0.050**

No. DE REGISTRO EN GUATEMALA: **PP-167**

No. DE REGISTRO EN EL COSTA RICA: **1007-P-591**

No. DE REGISTRO EN EL SALVADOR: **PP-167**

No. DE REGISTRO EN PANAMÁ: **78152**

No. DE REGISTRO EN REP. DOMINICANA: **4055**

**"ALTO, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"**

Ingrediente activo: Abamectina 0.5 g/Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use guantes de hule látex para realizar con seguridad la aplicación del producto.

**"ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO
PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE
COCINA"**

**"NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE
PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"**

"NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"

"EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

**CONDICIONES DE MANEJO,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco y bajo llave. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Manténgase entre 15 y 30°C preferentemente.

**"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO
A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O
JUGUETES"**

EXTER® GEL en su práctica jeringa dosificadora permite aplicar en forma fácil (sin tener que realizar mezclas), limpia y segura la dosis exacta para eliminar las cucarachas.

Únicamente retire el tapón de seguridad que cubre la boquilla, coloque la punta aplicadora, presione ligeramente el émbolo de la jeringa y realice la aplicación, el cebo no es un sellador, obtendrá un mejor resultado situando más puntos de cebado con poco cebo en grietas y/o hendiduras donde se observen rastros y evidencias de cucarachas.

EXTER®GEL elimina las siguientes especies:

Cucaracha alemana (*Blattella germanica*)

Cucaracha banda café (*Supella longipalpa*)

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*)

Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*)

Cucaracha australiana (*Periplaneta australasiae*)

Con ayuda de su punta aplicadora puede utilizarse en las cañerías, partes interiores del mobiliario, bajo las láminas del desagüe, en o bajo los recipientes de la basura, superficies ocultas, alrededor de los fregaderos y áreas de almacenamiento. También puede utilizarse en los rodapiés, alrededor de las puertas y ventanas, dentro, detrás y bajo los armarios, cajones y estantería, bajo y detrás de las estufas y refrigeradores.

MEDIDAS PRECAUTORIAS: No aplique el cebo en áreas donde puede contaminar alimentos, utensilios de cocina o comida procesada. Tampoco aplique sobre superficies donde la temperatura exceda de 40°C, el cebo puede derretirse. Este producto no debe ser ingerido, ni permitir el contacto con la piel ni ojos. Use equipo de protección personal (guantes de hule látex).

CONTRAINDICACIONES: No aplique en áreas que han sido tratadas recientemente con insecticidas (y/o nebulizador), y no rocíe insecticidas sobre el gel porque puede causar efecto repelente. No aplique en áreas donde se



limpia con frecuencia ya que disminuye su eficacia.

PRIMEROS AUXILIOS: “ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA”, “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA”, Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia, repita la operación hasta que el vómito salga claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBRE EXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

Llame al Centro Nacional de Intoxicaciones:

México Tels:

52 (55) 5598 66 59

52 (55) 56 1126 34

01800 00928 00

Guatemala Tel: 1-80100 29832

Costa Rica Tel: 223-1028

El Salvador Tel: 2525 5800 Ext. 148 y 149

Panamá Tel: 269 2741

República Dominicana Tel: 684 3478

Garantía: El fabricante garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

PRECAUCIÓN, PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR:

QUIMIX, S.A. de C.V.

Av. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. (55) 52-78-46-80

DISTRIBUIDO EN:

Guatemala por QUIMIX de Centroamérica S.A.,

Av. Del Ferrocarril (Atanasio Tzul) 19-97, Zona 12
Empresarial El Cortijo, Bodega No. 403.

Costa Rica por QUIMIX de Costa Rica QCR

S.A., Danza del Sol Curridabat Casa 2H, San
José, Costa Rica.

Panamá por QUIMIX de Panamá S.A., Auto

Depot, vía Tocumen frente a El Crisol, Oficina No.
A-16, Ciudad de Panamá.

República Dominicana por Tecnologías

Agrícolas y Veterinarias, SRL., Calle Rosario
No. 69, Mirador Norte, Santo Domingo, R.D.

HECHO EN MÉXICO

14.05.14 TR