

FICHA TÉCNICA

“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS”



No. DE REGISTRO EN PANAMA: 81598

Composición Química

Ingrediente activo:	P/P
Propoxur: 2-(1-metiletoxi)fenil metil carbamato.	1.00%
Ingredientes inertes:	
Diluyente y adsorbente.	99.00%
Total:.....	100.00%

CONTIENE: 10 GRAMOS DE PROPOXUR POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

INSECTICIDA EN POLVO HUMECTABLE

PRECAUCIÓN

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y

ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”.

“NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (Gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Se puede ingresar al área tratada de forma inmediata, pero se recomienda esperar un lapso de 30 minutos después de la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO: PROXUR® 1% PH es un insecticida listo para su uso como polvo seco, está especialmente recomendado para el control residual de insectos y alacranes en casas, edificios, oficinas, hospitales, hoteles, restaurantes, escuelas, almacenes, industrias, tiendas, camiones, trenes, barcos, aviones e industria alimentaria (áreas autorizadas).

Inspeccione el sitio a tratar y localice las grietas, agujeros, ductos de cableado, paneles eléctricos o de teléfono aplique el producto directamente sobre el área a tratar. La dosis puede variar dependiendo del tipo de plaga y sitio de aplicación.

Para la prevención y un mejor control de infestaciones por insectos rastreros puede aplicarse una banda de 1.8 a 3 m de ancho alrededor de las instalaciones y/o casas, sobre el suelo y vegetación, para mayor protección.

DOSIS Y MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

Plagas	Dosis	Recomendaciones
Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>) Grillos (<i>Neocurtilla hexadactyla</i> , <i>Acheta domesticus</i> , <i>Gryllus spp.</i>) Hormigas (<i>Lasius niger</i> , <i>Atta spp.</i> , <i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Solenopsis spp.</i>) Pescadito de plata (<i>Lepisma saccharina</i> , <i>Thermobia spp.</i>) Tijerillas (<i>Forficula auricularia</i> , <i>Labidura riparia</i>)	10-20 g / m ²	Espolvorear directamente en grietas y agujeros, alrededor de tarimas, puertas y ventanas. Debajo de refrigeradores, gabinetes. Sobre las rutas de acceso detectadas de hormigas y cucarachas. Debajo de las macetas y muebles en áreas exteriores de la casa. En áreas autorizadas de industrias de alimentos.
Termitas de la madera (<i>Reticulitermes spp.</i>)		Como tratamiento complementario, aplíquese en orificios y canales de la madera dañada, en grietas, uniones de tablas y sitios vulnerables.
Pulgas (<i>Ctenocephalides spp.</i> , <i>Pulex irritans</i>)	10-20 g / m ²	Aplíquese sobre las camas de las mascotas. Bajo las alfombras y lugares frecuentados por las mascotas. No se aplique este producto sobre personas ni sobre animales.
Moscas (<i>Musca domestica</i> , <i>Calliphora erythrocephala</i>)	40 g / m ²	Espolvoreese el insecticida alrededor de basureros o sobre la materia orgánica en descomposición sobre cada capa de materia orgánica de 10 cm de espesor. Como tratamiento preventivo y control de la mosca de la familia Phoridae, en panteones, aplíquese 60 g por cripta de manera uniforme.
Arañas (<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa spp.</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i> , <i>Vejois spp.</i>)		Identifíquese las grietas y escondrijos y aplíquese a estos sitios la cantidad de insecticida indicada. Además puede aplicarse una banda de 1.8 a 3 m de ancho alrededor de las instalaciones y casas, sobre el suelo y la vegetación, en los sitios donde se observa mayor actividad de plaga.

PROXUR 1% PH es un insecticida en polvo seco, para su uso deberá aplicarse directamente sobre el área a tratar a las dosis indicadas en el cuadro anterior.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto como se indica en PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:
No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para pájaros cantores y aves canoras. Este producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos.
Use equipo personal de protección.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:
Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya o perforo los envases vacíos a fin de evitar que sean

reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:
Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: Contracción de pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuesa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR VÍA ORAL: Si la persona está **CONSCIENTE**, provoque el vómito. Si la persona está **INCONSCIENTE**, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. **“NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”**.
POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.



Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: "EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO".

POR VÍA DÉRMICA: "EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES".

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:**QUIMIX, S.A. DE C.V.**

Av. Central No. 206 2do piso, Col. San Pedro de los Pinos, México D.F., C.P. 01180 Tel. (0155) 52784680

Distribuido en Panamá por:

QUIMIX DE PANAMÁ, S.A.

Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol, Oficina No. A-16, Ciudad de Panamá.

HECHO EN MÉXICO**TELÉFONOS DE CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:**

07.04.15 TR

País	Teléfono
REP. DOMINICANA	(809) 6843478
GUATEMALA	(502) 22320735
EL SALVADOR	(503) 25255800
COSTA RICA	(506) 22231028
PANAMÁ	(507) 2692741

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**GRUPO QUÍMICO:** Carbamatos

TRATAMIENTO: Administre Atropina, 2 comprimidos de 0.5 mg. cada uno P.O., repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar en adultos 1-5 mg I.V. o I.M., en niños 0.01-0.05 mg / kg de peso corporal. Cada 5 a 15 min hasta alcanzar la atropinización. Dosis de mantenimiento: 0.5 a 1 mg I.V. (adulto) cada hora, según respuesta del paciente, durante al menos 48 h. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicados.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.