

FICHA TÉCNICA



“PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO”

No. DE REGISTRO EN REP. DOMINICANA 4056

COMPOSICIÓN QUÍMICA

	P/P
Ingrediente Activo:	
Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il) -3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona.	0.005%
(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	
Ingredientes Inertes:	
Atrayentes, colorante, aglutinante, vehículo y saborizante.	99.995%
Total:	100.00%

CONTIENE: 0.05 GRAMOS DE BROMADIOLONA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE/

CEBO ENVENENADO

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”.

ACCIÓN: ERRADIC CEBO es un rodenticida anticoagulante de segunda generación que de una sola dosis, elimina ratas y ratones en el ámbito urbano.

MODO DE EMPLEO:

Colocar el cebo dentro de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Se recomienda colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

PRECAUCIÓN

PLAGAS QUE CONTROLA:

PLAGAS	APLICACIÓN DE DOSIS
<p>RATAS</p> <p>Rata de alcantarilla <i>Rattus norvegicus</i> Rata de los tejados <i>Rattus rattus</i></p>	<p>Áreas Urbanas</p> <p>Usar 50 a 100 g por cebadero a intervalos de 5 a 10 metros para el control de ratas. Usar 25 g por cebadero a intervalos de 2.5 metros para el control de ratones. Revisar las áreas o las estaciones de cebado diariamente. Repetir la dosis hasta que no observe consumo.</p>
<p>RATONES</p> <p>Ratón doméstico <i>Mus musculus</i></p>	<p>Áreas Exteriores (Patios, jardines, bodegas, campos de golf, parques, etc.) Colocar el cebo directamente en las madrigueras, cerca de los daños y en los caminos de los roedores a través de la vegetación. Usar 1-3 Kg por cada hectárea y por aplicación, según el grado de infestación. Repetir las aplicaciones de ERRADIC CEBO hasta que la actividad de los roedores cese.</p>

Cómo usar Erradic Cebo:



Corte la bolsa por la línea punteada.



Coloque esta bolsa en un lugar frecuentado por las ratas.



Reponga el cebo a medida que las ratas lo consuman.



Quando note que el cebo no se consume, esto indicará que la plaga fue

SÍNTOMAS: Iniciales, epistaxis (sangrado por la nariz), sangrado por las encías, petequias (puntillero en la piel) y hematomas (moretones) alrededor de las articulaciones y los glúteos, dolor abdominal y de espalda, sangre en orina, cólico renal, debilidad, anemia e hipotensión.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO

Primeros auxilios: POR VÍA ORAL: Si la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.



POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Si la contaminación fue en los ojos, lave con suficiente agua limpia durante un lapso de 15 minutos.

POR VÍA DÉRMICA: Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

GRUPO QUÍMICO: Hidroxicumarina.

ANTÍDOTO: Vitamina K1

TRATAMIENTO: El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Administrar tratamiento con dosificación específica de Vitamina K1 (Fitonadiona) por vía intramuscular, oral o intravenosa. Lleve el paciente con el médico.

Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

FORMULADO EN MÉXICO

13.04.15 TR

**LLAME AL CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORÍA TOXICOLÓGICA O TRASLADÉ
RÁPIDAMENTE AL PACIENTE AL CENTRO
HOSPITALARIO MÁS CERCANO.**

País	Teléfono
REP. DOMINICANA	(809) 6843478
GUATEMALA	(502) 22320735
EL SALVADOR	(503) 25255800
COSTA RICA	(506) 22231028
PANAMÁ	(507) 2692741

Producto formulado por QUIMIX, S.A. de C.V. y distribuido en **República Dominicana** por: Tecnologías Agrícolas y Veterinarias, SRL. Calle Rosario No. 69, Mirador Norte, Santo Domingo, D. N., en Guatemala por QUIMIX de Centroamérica, S.A., en Costa Rica por Quimix de Costa Rica QCR S.A., en Panamá por QUIMIX de Panamá, S.A. y en El Salvador por SAGRIP.

FABRICADO POR:
QUIMIX S.A. de C.V.
AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,