

## FICHA TÉCNICA



“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS”

No. DE REGISTRO EN REP. DOMINICANA 4137

### Composición Química

	P/P
<b>Ingrediente Activo:</b>	
Propoxur: 2-(1-metiletoxi)fenil metil carbamato	15.00%
<b>Ingredientes Inertes:</b>	
Diluyente y adsorbente.	85.00%
<b>TOTAL:.....</b>	<b>100.00%</b>

**CONTIENE: 150 GRAMOS DE PROPOXUR  
POR KILOGRAMO DE PRODUCTO  
FORMULADO**

**INSECTICIDA CONCENTRADO  
EMULSIONABLE**

# PRECAUCIÓN

**“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL  
PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES  
DE USAR ESTE PRODUCTO”**

### FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”. “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:** Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

**PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS:** Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 minutos a 60 minutos posteriores a la aplicación.

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS**

**INSTRUCCIONES DE USO:** PROXUR® 15 EC es un insecticida recomendado para el control de plagas en áreas urbanas como casas habitación, jardines, restaurantes, hospitales, escuelas, cines, hoteles, mercados, áreas industriales y transportes.

**PROXUR® 15 EC** tiene un efecto inicial y prolongado en el combate de diversas especies de cucarachas, hormigas, alacranes, arañas, chinches, pulgas, moscas, mosquitos, grillos y pescaditos de plata.

Plagas	Dosis	Tratamiento	Aplicación
<b>Alacranes</b> ( <i>Centruroides spp.</i> ) <b>Cucarachas</b> ( <i>Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis</i> ) <b>Chinches</b> ( <i>Cimex lectularius, Triatoma sp.</i> ) <b>Hormigas</b> ( <i>Monomorium minimun, M. Pharaonis, Solenopsis invicta</i> )	<b>Inicial</b> – 40 ml  <b>Mantenimiento</b> – 20 ml  <b>20 – 40 ml</b> por L de agua.	Aspersión en áreas interiores y en estructuras externas.	En paredes, pisos, grietas y hendiduras.  1L de mezcla rinde 20m <sup>2</sup>  Iniciar un programa de <b>control de plagas</b> considerando el control químico dependiendo la <b>especie de plaga</b> a controlar y el tiempo de rotación del producto.
<b>Moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> ) <b>Mosquitos</b> ( <i>Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.</i> ) <b>Arañas</b> ( <i>Latrodectus mactans, Lycosa spp.</i> ) <b>Pulgas</b> ( <i>Ctenocephalides canis, C. felis, Xenopsylla cheopis</i> ) <b>Grillos</b> ( <i>Acheta domesticus</i> ) <b>Pescadito de plata</b> ( <i>Lepisma saccharina</i> )	<b>Inicial</b> – 20 ml  <b>Mantenimiento</b> – 10 ml  <b>10 – 20 ml</b> por L de agua.	Aspersión residual para programas de mantenimiento.	Casas, hoteles, restaurantes, oficinas, escuelas, fábricas, transportes e industrias alimentarias (sólo en áreas permitidas).

#### ADVERTENCIA PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN LOS ANIMALES Y ECOLOGÍA:

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para pájaros cantores y aves canoras. Este producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Use equipo personal de protección.

#### INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya o perfora los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

**“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”**

#### SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: Contracción de pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR VÍA ORAL:** Si la persona está **CONSCIENTE**, no provoque el vómito. **“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”**. Si la persona está **INCONSCIENTE**, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve

inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL:** “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

**POR VÍA DÉRMICA:** “EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”.

**TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA TOXICOLÓGICA: 809 684 -3478**

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

**GRUPO QUÍMICO:** Carbamatos

**TRATAMIENTO:** Administre Atropina, 2 comprimidos de 0.5 mg. cada uno P.O., repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar en adultos 1-5 mg I.V. o I.M., en niños 0.01-0.05 mg/kg de peso corporal. Cada 5 a 15 min hasta alcanzar la atropinización.

Dosis de mantenimiento: 0.5 a 1 mg I.V. (adulto) cada hora, según respuesta del paciente, durante al menos 48 h. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicados.

**GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V.** garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

**FORMULADO EN MÉXICO POR:**

VELSIMEX, S.A. DE C.V.  
y/o QUIMIX, S.A. de C.V.  
Av. Central 206, 2do Piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
Del. Álvaro Obregón,  
C.P. 01180, México D.F.  
Tel. 52-78-46-80

**DISTRIBUIDO EN REPÚBLICA DOMINICANA POR:**

TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS, SRL.  
CALLE ROSARIO No 69, MIRADOR NORTE,  
Santo Domingo, D. N.

**FORMULADO EN MÉXICO**

13.04.15 TR